
LA DERIVA DEI CONTINENTI
1912 TEORIA dello scienzato WEGENER
A SOSTEGNO DELLA SUA IPOTESI:
RICOSTRUÌ LA PAGEA ACCOSTANDO LE SAGOME DEI CONTINENTI
STUDIÒ LA DISTRIBUZIONE DEGLI ANTICHI GHIACCIAI E DEI FOSSILI DI ANIMALI E VEGETALI
MESOSAURO piccolo rettile ritrovato sia sulle coste africane che sudafricane
GLOSSOPTERIS felce ritrovata in America meridionale, Africa, Antartide, India e Australia
TEORIA RIPRESA NEL 1950
ESPLORAZIONI DEL FONDO MARINO PER DISEGNARE MAPPE PER LA NAVIGAZIONE DEI SOTTOMARINI
LE TERRE EMERSE IN ORIGINE NON ERANO SUDDIVISE IN CONTINENTI DISTINTI MA UNITI IN UN SOLO BLOCCO
UN SUPERCONTINENTE
PANGEA (tutte le terre)
LA PANGEA SI SAREBBE SPEZZATA NEI CONTINENTI
CHE COME ZATTERE ALLA DERIVA SI SAREBBERO POSIZIONATE PER COME LI CONOSCIAMO OGGI
UN UNICO OCEANO
PANTHALASSA (tutto il mare)